БИОТА

8(861) 297-36-03, 8(861) 297-00-10, 8(918) 188-46-08
www.disbakteriozu.net

ПРЕИМУЩЕСТВА БИФИЛАКТА БИОТА ПЕРЕД АПТЕЧНЫМИ ПРОБИОТИКАМИ И ПЕРЕД КИСЛОМОЛОЧНЫМИ ПРОБИОТИЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ С БИФИДОБАКТЕРИЯМИ И ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ.

ДОКАЗАНО:

1 Нарушение нормальной микрофлоры кишечника (дисбактериоз) приводит к развитию целого ряда тяжелых заболеваний:

- Желчекаменная болезнь
- Гипо– и гипертензия
- Гипо– и гиперхолестеринемия

- Гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- Диарея, запор, колит, синдром мальабсорбции
- Синдром раздраженного кишечника
- Ревматоидный артрит, спондилоартриты, другие поражения суставов и соединительной ткани
- Эндо – и суперинфекция различной локализации
- Синдром «трансплантат против хозяина»

БИОТА

- Снижение эффективности гормональных противозачаточных средств
- Анемия, неонатальная анемия
- Острая мезентериальная ишемия
- Кахексия, подагра, другие болезни водно–солевого обмена
- Злокачественные новообразования желудка, толстой кишки, груди.

- Портальная системная энцефалопатия, другие поражения центральной и периферической нервной системы и печени
- Кариес
- Нарушение менструального цикла
- Мочекаменная болезнь
- Бронхиальная астма, атопический дерматит и другие аллергические заболевания
- Нарушения тонуса сосудов
- Снижение иммунитета
- Дисбиотические нарушения у детей с первых дней жизни (что связано с дисбиозным состоянием матери в период беременности. Это является важным первым фактором, определяющим внутриутробное здоровье ребенка, его здоровье после родов и правильное формирование микро–флоры ребенка в дальнейшем).

БИОТА

2 Дисбактериоз сам не проходит, его необходимо лечить.

Восстановить микрофлору в кишечнике могут:

- только *ЖИВЫЕ бифидобактерии и лактобактерии* (эти бактерии в норме составляют 96-98% всей микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Нормальная микрофлора выполняет в организме 40 незаменимых функций, как настоящий самостоятельный орган, поэтому нарушение в составе и количестве этих бактерий ведет к развитию различных болезней);
- ТОЛЬКО ЖИВЫЕ бифидобактерии и лактобактерии *в определенной фазе РОСТА*, которые заселяются в кишечнике и остаются там для размножения, т.к. только в определенной фазе роста у этих бактерий *появляются ворсинки,* которыми они могут прикрепиться к стенке кишечника и остаться там для восстановления микрофлоры и размножения;
- только определенные разновидности (штаммы) бифидобактерий и лактобактерий, которые *проходят кислотный барьер желудка* и остаются жизнеспособными;
- только определенные разновидности (штаммы) бифидобактерий и лактобактерий, которые в норме *представляют большинство* среди всех штаммов бифидо- и лактобактерий в организме здорового человека;
- только определенные разновидности (штаммы) бифидобактерий и лактобактерий, которые *представлены на всех слизистых* организма человека, чтобы восстановить весь биоценоз организма;
- только определенные разновидности (штаммы) бифидобактерий и лактобактерий, которые имеют *способность к высокой скорости роста*, чтобы конкурировать с патогенной микрофлорой;
- только *правильные сочетания разновидностей (штаммов) бифидобактерий и лактобактерий,* которые взаимно поддерживают друг друга при заселении. Бифидобактерии и лактобактерии являются друг для друга симбионтами и синергистами, т.к. они не могут заселяться и жить друг без друга, потому что они производят друг для друга нужные продукты жизнедеятельности и усиливают друг друга;

БИОТА

- только *пищевые продукты, которые созданы и ферментированы самими бифидобактериями и лактобактериями, где они росли, размножались, куда они выделяли свои лечебные продукты обмена (метаболиты)*, которые проведут их по кишечнику и позволят заселиться, уничтожая патогенную микрофлору, расчищая места для прикрепления бифидо- и лактобактерий, восстанавливая слизистую оболочку кишечника, пищеварение, иммунитет человека, давая полезным бактериям еду и преимущества в пораженном кишечнике, пока бифидобактерии и лактобактерии заселяются, набирают силу и размножаются на новом месте.

Эти лечебные продукты обмена бактерий (метаболиты), которые бифидобактерии и лактобактерии выделяют в норме в кишечнике человека в процессе своего роста, а, также, в те пищевые продукты, в которых они растут и которые они ферментируют, являются чрезвычайно необходимыми для излечения организма человека и для заселения самих бактерий, т. к. они выполняют следующие функции:

- метаболиты стимулируют рост собственной полезной микрофлоры и способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника биологическим путем;
- синтезированный бактериями метаболит - молочная кислота и ее буферные соли нормализуют кислотность в желудочно-кишечном тракте независимо от того, страдает ли пациент от повышенной или пониженной кислотности;
- метаболиты подавляют патогенные микроорганизмы;
- метаболиты способствуют регенерации эпителия слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и позволяют сохранить физиологические и биологические функции слизистой оболочки кишечника;
- метаболиты повышают иммунитет, они оказывают иммуномодулирующее действие и усиливают защитные функции организма благодаря стимуляции иммунного ответа;
- синтезированные бактериями метаболиты - короткоцепочечные летучие жирные кислоты обеспечивают восстановление поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, восстанавливают нарушенный водно-электролитный баланс в просвете кишки.

3 Для профилактики дисбактериоза и лечения первой-второй стадии дисбактериоза достаточно принимать *живой* пробиотический *продукт* Бифилакт БИОТА

по 100-150 мл 2-3 раза в день в течение 1,5 - 2 месяцев за 20-30 минут до еды и соблюдать правильное питание. После курсового приема профилактический прием бифилакта БИОТА может быть постоянным по 100-150 мл в день или курсами по 1-1,5 месяца один раз в 3-4 месяца.

БИОТА

В качестве продукта питания прием бифилакта БИОТА не ограничивается. Он является вкусным, полезным диетическим продуктом каждодневного приема.

Для лечения третьей и четвертой стадии дисбактериоза живые пробиотические продукты используют в комплексном лечении, которое включает в себя прием и дезинфектантов, и антибиотиков, и сорбентов, и противовоспалительных препаратов. *Прием препаратов назначается врачом.* Необходимо найти причину дисбактериоза. После лечебного курса профилактический прием бифилакта БИОТА может быть постоянным по 100-150 мл в день или курсами по 1-1,5 месяца один раз в 3-4 месяца.

В качестве продукта питания прием бифилакта БИОТА не ограничивается. Он является вкусным, полезным диетическим продуктом каждодневного приема.

4 Бифилакт БИОТА является уникальным пробиотическим лечебно-профилактическим кисломолочным продуктом с живыми бифидобактериями и лактобактериями, содержащим все лечебные метаболиты (продукты обмена) бифидобактерий и лактобактерий,

т.к. он *производится по уникальной запатентованной технологии*, которая позволяет бифидобактериям и лактобактериям непосредственно ферментировать молоко, вырастать в нем в лечебных концентрациях, превращая молоко в целебный кисломолочный пробиотический продукт и с лечебными бактериями, и с их лечебными метаболитами.

Бифилакт БИОТА – это уникальная композиция ЖИВЫХ пробиотиков (бифидобактерии и лактобактерии) в лечебных концентрациях, их лечебных метаболитов и пребиотиков (метаболиты самих бактерий, расщепленный бактериями белок молока и, добавленная на стадии ферментации молока, фруктоза).

БИОТА

Очень важно отметить, что бифидобактерии и лактобактерии, ферментируя молоко для получения бифилакта БИОТА, частично разлагают лактозу (молочный сахар), используя ее в пищу при ферментации молока, и *уменьшают количество лактозы уже в готовом бифилакте БИОТА.* Такие продукты со сниженным содержанием лактозы требуются людям с непереносимостью лактозы (при лактазной недостаточности). Очень часто непереносимость лактозы (лактазная недостаточность) наблюдается у детей и пожилых людей.

Более того, живые и активные бифидобактерии и лактобактерии в бифилакте БИОТА при попадании в кишечник начинают в нем активно приживаться и размножаться, при этом, они в качестве пищи используют и *расщепляют лактозу в просвете кишечника, уменьшая ее количество уже в самом кишечнике.* Поэтому, при приеме бифилакта БИОТА происходит *уменьшение симптомов лактазной недостаточности у детей и взрослых.*

Победитель краевой целевой программы «Качество» Кубани

Кисломолочный пробиотический
продукт лечебно-профилактического питания
Бифилакт «БИОТА»
с бифидобактериями и лактобактериями

БИОТА

ОТЛИЧИЕ БИОТЫ ОТ АПТЕЧНЫХ И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОБИОТИКОВ

Бифилакт БИОТА, ферментированный бифидобактериями и лактобактериями	Аптечные препараты	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, лактобактериями
1. Бифилакт БИОТА *произведен по уникальной запатентованной технологии*, когда бифидобактерии и лактобактерии вносятся в молоко в виде биомассы и ферментируют молоко в готовый продукт-бифилакт БИОТА, размножаясь в молоке. Поэтому, *бифилакт БИОТА содержит живые бифидобактерии и лактобактерии* (эти бактерии являются основными пробиотическими микроорганизмами человека и составляют 96% всей полезной микрофлоры организма человека). Живые бифидобактерии и лактобактерии бифилакта БИОТА благодаря уникальной технологии способны сразу заселяться в кишечнике и восстанавливать количество нужной микрофлоры, т.к. находятся в такой фазе роста, когда у них образовываются ворсинки, которые и позволяют бактериям прикрепляться к стенкам кишечника, начинать там размножаться и проявлять свои лечебные свойства. Т.е. бифидобактерии и лактобактерии становятся постоянными жителями кишечника и постоянно оздоравливают организм изнутри.	1. Не содержат живые бактерии, а содержат сухие и лишенные жизнедеятельности бактерии, чтобы они могли выдержать длительные сроки хранения. Бактерии в таком состоянии не имеют ворсинки для прикрепления в кишечнике, не способны прикрепиться к кишечной стенке и начать размножаться. Они просто находятся в просвете кишечника и начинают оживать лишь через 8 часов после попадания в кишечник, но кишечник к этому времени опорожняется и все эти бактерии выходят из организма с калом. Микрофлору такие препараты восстановить не могут. Помощь при их применении кратковременная и незначительная, и заканчивается сразу после окончания приема таблеток (капель, капсул). Вот почему уже через несколько дней после окончания курса таблеток(капель, капсул) все симптомы дисбактериоза возобновляются.	1. Чаще всего не содержат живые бифидобактерии и лактобактерии, т.к. на заводах воспроизвести биотехнологический цикл ферментации молока живыми бифидобактериями и лактобактериями невозможно. На молочных заводах готовят просто обогащенные продукты. Для этого сквашивают молоко обычными молочнокислыми микроорганизмами (не лечебными, не живущими в кишечнике) и в готовый кисломолочный продукт вносят сухие, нежизнеспособные бифидобактерии или лактобактерии, перемешивают, сразу продукт разливают в бутылки и перемещают в холодильник. Бактерии остаются нежизнеспособными, так как им не дали возможность восстановить свою жизнедеятельность вследствие того, что они не ферментировали молоко. Бифидобактерии и лактобактерии в таком состоянии не могут ни закрепиться на кишечной стенке для размножения, ни прижиться в организме человека, ни оздоравливать организм. Т.е. эффект от них незначительный, быстро проходящий.
2. Бифидобактерии и лактобактерии находятся в бифилакте БИОТА *в лечебных дозах и в активной фазе роста.* Это позволяет этим бактериями в нужной концентрации попадать в кишечник для конкуренции с патогенной микрофлорой,	2. Дозы - лечебные в аптечных препаратах (таблетках, каплях, капсулах), но бифидобактерии и лактобактерии в этих препаратах находятся в анабиозе, лишены жизнеспособности, не находятся в активной фазе роста для того,	2. Нет лечебных доз бактерий, содержат лишенные активности и жизнеспособности бактерии, которые не могут остаться в кишечнике и оказать лечебный эффект.

БИОТА

Бифилакт БИОТА, ферментированный бифидобактериями и лактобактериями	Аптечные препараты	Кисломолочные продукты,обогащенные бифидобактериями, лактобактериями
более того, они находятся в такой фазе роста после ферментации бифилакта БИОТА, когда они активно размножаются и у них образовываются ворсинки, которыми они могут прикрепиться на кишечной стенке. Это позволяет бифидобактериям и лактобактериям из БИОТЫ эффективно прикрепляться на кишечной стенке и быстро размножаться для восстановления микрофлоры кишечника.	чтобы препараты могли долго храниться, а, значит, у таких бифидобактерий и лактобактерий нет ворсинок для прикрепления к стенкам кишечника, они не могут быстро размножаться. Т.е. бактерии, приготовленные для долгого хранения в препаратах, не приготовлены для эффективного заселения в кишечнике.	
3. БИОТА *содержит лечебные продукты обмена бифидобактерий и лактобактерий*, т.к. при уникальной и запатентованной технологии производства БИОТЫ бифидобактерии и лактобактерии непосредственно ферментируют молоко и выделяют свои лечебные вещества (метаболиты) прямо в кисломолочный продукт бифилакт БИОТА. После приема бифилакта БИОТА эти полезные лечебные вещества (метаболиты): а) стимулируют рост нормальной микрофлоры в кишечнике; б) восстанавливают слизистую желудочно-кишечного тракта; в) восстанавливают процессы пищеварения и всасывания полезных веществ в кишечнике; г) уничтожают патогенную микрофлору; д) повышают иммунитет. Т.е. метаболиты бифидобактерий и лактобактерий начинают действовать незамедлительно, а на 3-4-ый день в кишечнике приживается уже достаточное количество самих бифидобактерий и лактобактерий, они начинают оказывать лечебные эффекты непосредственно в организме и синтезировать свои полезные вещества уже в просвет кишечника. Эта уникальная, незамедлительная и комплексная помощь от применения бифилакта БИОТА возможна благодаря *уникальной и запатентованной технологии производства бифилакта БИОТА.*	3. Не содержат полезные метаболиты бифидобактерий и лактобактерий. Препараты содержат нежизнеспособные бифидобактерии и лактобактерии в анабиозе. Это позволяет бактериям оказать лишь незначительный эффект, который заканчивается через несколько дней после окончания приема препарата, т.к. бактерии не могут прижиться и остаться жителями кишечника, они не успевают выйти на те стадии роста, когда они могут прикрепляться, размножаться и выделять свои лечебные метаболиты в кишечник.	3. Не содержат полезных продуктов обмена (метаболитов) бифидобактерий и лактобактерий, т.к. обогащенные бифидобактериями и лактобактериями обычные кисломолочные продукты производятся по обычной заводской технологии с помощью обычных кисломолочных бактерий, не предусматривающей ферментации молока непосредственно бифидобактериями и лактобактериями. В лучшем случае, бифидобактерии и лактобактерии в состоянии анабиоза, лишенные жизнедеятельности, вводятся в уже готовый кисломолочный продукт, сквашеный и созревший на обычных кисломолочных бактериях. А, если, бифидобактерии и лактобактерии не ферментировали молоко, то в таком продукте нет их лечебных метаболитов и нет готовых к заселению в кишечнике бифидобактерий и лактобактерий.

БИОТА

Бифилакт БИОТА, ферментированный бифидобактериями и лактобактериями	Аптечные препараты	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, лактобактериями
4. *БИОТА содержит одновременно бифидобактерии и лактобактерии, которые помогают друг другу приживаться в кишечнике.* Бифидобактерии выделяют нужные вещества для лактобактерий, а лактобактерии - для бифидобактерий. Друг без друга они не приживаются.	4. Лишенные жизнедеятельности бактерии не могут синтезировать нужные друг для друга вещества. Они даже оживать не успевают в кишечнике и выходят из организма при стуле.	4. Для приготовления обогащенного кисломолочного продукта бифидобактерии и лактобактерии вводятся в лишенном жизнедеятельности состоянии в уже приготовленный обычными бактериями кисломолочный продукт. Такие продукты не ферментируются бифидобактериями и лактобактериями, поэтому бифидобактерии и лактобактерии не синтезируют полезные вещества в эти продукты. Поскольку лишенные жизнедеятельности бифидобактерии и лактобактерии не успевают ожить в кишечнике и синтезировать полезные друг для друга вещества.
5. БИОТА содержит *нужные лечебные разновидности (штаммы) бифидобактерий и лактобактерий, которые используют в медицине.* В живом и активном состоянии эти бактерии эффективно устраняют нарушение микрофлоры кишечника. Бифидобактерии выделяют нужные вещества для лактобактерий, а лактобактерии для бифидобактерий. Друг без друга они не приживаются.	5. Содержат штаммы бактерий, использующиеся в медицине, но лишенные жизнедеятельности бактерии в препаратах не могут оказать должного лечебного эффекта.	5. При производстве кисломолочных продуктов для широкого употребления на молочных заводах не учитывают лечебные свойства, используемых для обогащения бифидобактерий и лактобактерий.
6. БИОТА содержит такие разновидности (штаммы) бифидобактерий, которые *выдерживают воздействие кислорода* и остаются высоко жизнеспособными в кишечнике (это важный фактор для выживания бифидобактерий, т.к. большинство штаммов бифидобактерий очень чувствительны к кислороду и гибнут от соприкосновения с ним, т.к. они анаэробы).	6. Этот фактор не учитывается. Используются разные штаммы: и устойчивые к кислороду, и неустойчивые.	6. Для обогащения кисломолочных продуктов используют разные штаммы бифидобактерий и лактобактерий. Фактор устойчивости штаммов бифидобактерий к кислороду и их высокой жизнеспособности не учитывается.
7. БИОТА содержит такие разновидности (штаммы) бифидобактерий и лактобактерий, которые *выдерживают воздействие соляной кислоты желудка*, проходят по кишечнику без нарушения жизнеспособности, эффективно приживаются и размножаются, восстанавливая микрофлору кишечника.	7. Этот фактор не всегда учитывается, что снижает объем бактерий, способных восстановить свою жизнеспособность в кишечнике.	7. Этот фактор не всегда учитывается, что не позволяет большому количеству бифидобактерий и лактобактерий преодолеть кислотный барьер желудка и они погибают до поступления в кишечник.

БИОТА

Бифилакт БИОТА, ферментированный бифидобактериями и лактобактериями	Аптечные препараты	Кисломолочные продукты,обогащенные бифидобактериями, лактобактериями
8. В БИОТЕ подобраны такие *штаммы бифидобактерий и лактобактерий, которых больше всего в кишечнике и на других слизистых организма здорового человека – это основные универсальные штаммы бифидобактерий и лактобактерий.* Подбор именно таких универсальных разновидностей бифидобактерий и лактобактерий в бифилакте БИОТА *позволяет восстановить биоценоз всего организма человека, т.е. восстановить нормальную микрофлору на всех слизистых.*	8. Этот фактор не учитывается. Часто используется несколько штаммов бифидобактерий и лактобактерий, среди которых есть и широко распространенные и очень специфичные, направленные на лечение определенных систем организма. Разнообразие штаммов ухудшает их возможности к восстановлению жизнеспособности, т.к. штаммы конкурируют за пищевые ресурсы и места адгезии на кишечной стенке.	8. Этот фактор не учитывается. Часто используются разнообразные сочетания штаммов бифидобактерий и лактобактерий. Большинство из этих штаммов не живут на слизистых кишечника. Более того, эти разные штаммы начинают конкурировать друг с другом за пищевые ресурсы и мешают друг другу восстановить свою жизнедеятельность в кишечнике.
9. В БИОТЕ *используется только один штамм высоколечебных бифидобактерий и только один штамм высоколечебных лактобактерий.* Они эффективно заселяются, размножаются и *помогают друг другу.*	9. Этот фактор не учитывается. Часто в препарате используется несколько разных штаммов бифидобактерий и несколько разных штаммов лактобактерий одновременно. Они могут конкурентно мешать друг другу.	9. Этот фактор не учитывается. Часто используется несколько разнообразных штаммов бифидобактерий и лактобактерий. Эти штаммы разные по своей скорости роста, пищевым потребностям, месту прикрепления. Часто они не являются основными жителями кишечника. Это заставляет иммунитет бороться с таким разнообразием антигенов, что ухудшает условия для восстановления жизнедеятельности бактерий.
10. В БИОТЕ *используются одновременно штаммы бифидобактерий и лактобактерий, которые заселяют и тонкий кишечник, и толстый кишечник,* что важно при устранении дисбактериозов разной локализации (лактобактерии колонизируют в основном тонкий кишечник, бифидобактрии колонизируют толстый кишечник)	10. Часто используется одновременно много штаммов бифидобактерий и лактобактерий. Иммунитет больного человека, принимающего такой препарат, может напряженно реагировать на такой объем лекарственных антигенов. Более того, бактериям в таком комплексном препарате еще труднее восстановить свою жизнедеятельность из нежизнеспособного состояния в связи с конкуренцией.	10. Этот фактор не учитывается при производстве обогащенных кисломолочных продуктов. Наличие бифидобактерий и лактобактерий в таких кисломолочных продуктах является фактором для привлечения покупателей, а не фактором обеспечения высоких лечебно-профилактических свойств этих продуктов.
11. БИОТА *клинически испытана* (статьи, диссертации, экспертные заключения, рекомендации Департамента здравоохранения смотрите на сайте www.disbakteriozu.net). Доказана высокая клиническая эффективность применения бифилакта БИОТА у детей и взрослых для лечения и профилактики дисбактериоза, сохранения здоровья и молодости в любом возрасте, а также, при комплексном лечении пищевой аллергии, ОРЗ, гриппа, анемии, нарушений иммунитета, при заболеваниях	11. Штаммы, используемые в препаратах, испытаны, но бактерии находятся в препаратах в анабиозе, лишены жизнедеятельности, что не позволяет бифидобактериям и лактобактериям оставаться в кишечнике и эффективно корректировать микрофлору.	11. Нет клинических испытаний продуктов. Выпускаются для массового употребления. Указание о том, что они обогащены пробиотическими бактериями является просто маркетинговым ходом, чтобы привлечь покупателей.

БИОТА

Бифилакт БИОТА, ферментированный бифидобактериями и лактобактериями	Аптечные препараты	Кисломолочные продукты,обогащенные бифидобактериями, лактобактериями
костно-мышечного аппарата, бронхо-легочной системы, заболеваниях печени и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, у онкобольных.		
12. В БИОТЕ *отсутствуют дрожжи,* которые при наличии могут провоцировать брожение, гниение в кишечнике, стимулировать развитие патогенной микрофлоры и нарушение иммунитета.	12. Иногда содержат дрожжи.	12. Продукты на кефирной основе получают с помощью дрожжей. В настоящее время, когда иммунитет у населения снижен, дрожжи могут вызывать целый ряд заболеваний, приживаясь в организме, могут вызывать ухудшение пищеварения, брожение, гниение в кишечнике, нарушение иммунитета, аллергии.
13. В БИОТЕ *казеин молока расщеплен бифидобактериями и лактобактериями в легкоусваиваемую форму белка и аминокислоты* в результате ферментации молока непосредственно бифидобактериями и лактобактериями и благодаря уникальной запатентованной технологии производства БИОТЫ. Такая высокая пищевая ценность БИОТЫ позволяет использовать ее для восстановления пищеварения даже у больных после панкреато-дуоденальной резекции (удалении поджелудочной железы) и при различных ферментопатиях.	13. -	13. Обогащенные кисломолочные продукты содержат трудноперевариваемый белок молока, который ухудшает самочувствие при нарушениях пищеварения, ферментопатиях, непереносимости белка молока. Такие продукты не рекомендуются к применению у больных при целом ряде заболеваний.
14. *В БИОТЕ происходит только молочнокислое брожение,* поэтому БИОТА может использоваться при широком спектре заболеваний и у детей.	14. –	14. Часто в кисломолочных продуктах происходит спиртовое брожение, что ухудшает состояние детей и взрослых (например, кефир и прочие).
15. *БИОТА обладает диетическими свойствами,* т.к. содержит 1% молочного жира, а белок молока расщеплен в легкоусвояемую форму и аминокислоты.	15. –	15. Разная продукция по жиру. Нет продукции с такими параметрами расщепления трудноперевариваемого белка молока. Не рекомендуется при целом ряде заболеваний, в том числе, при пищевых аллергиях, при непереносимости белка молока, при ферментопатиях, в детском и пожилом возрасте.
16. Бифилакт БИОТА не содержит красители, ГМО, стабилизаторы, консерванты, пищевые добавки. *Бифилакт БИОТА исключительно натуральный продукт.* Для производства БИОТЫ используется только высококачественное молоко	16. Часто содержат красители, консерванты, пищевые добавки.	16. Часто содержат красители, ГМО, стабилизаторы, консерванты, пищевые добавки. Используется молоко разного качества. Часто используется сухое молоко, сухие молочные белки, сухие сливки, растительные сухие белки и жиры

БИОТА

Бифилакт БИОТА, ферментированный бифидобактериями и лактобактериями	Аптечные препараты	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, лактобактериями
от здоровых животных без антибиотиков, без различных ингибиторов молока (без токсинов, без остатков моющих средств и т.д.), т.к. бифидобактерии и лактобактерии не выживут в молоке с ингибиторами, не смогут ферментировать такое молоко, и продукт не получится.		и т.д. Технология получения обогащенных кисломолочных продуктов позволяет использовать молоко с ингибиторами, т.к. на заводах не используют для ферментации молока бифидобактерии и лактобактерии чувствительные к ингибиторам, а сквашивают молоко обычными кисломолочными бактериями, которые устойчивы к ингибиторам.
17. Живые бифидобактерии и лактобактерии при ферментации молока для получения бифилакта БИОТА *частично разлагают молочный сахар лактозу, уменьшая ее количество в готовом бифилакте БИОТА.* Такие продукты со сниженным содержанием лактозы требуются людям с непереносимостью лактозы (при лактазной недостаточности). Очень часто непереносимость лактозы (лактазная недостаточность) наблюдается у детей и пожилых людей.	17. В лекарственные препараты часто добавляют лактозу, как компонент. Такие препараты противопоказаны людям с непереносимостью лактозы (при лактазной недостаточности).	17. Поскольку на заводах для ферментации большинства кисломолочных продуктов часто используют только молочнокислые бактерии, а не бифидобактерии и лактобактерии, то снижение лактозы в этих продуктах незначительное, т. к обычные кисломолочные бактерии не используют в пищу лактозу, а внесенные в готовый кисломолочный продукт нежизнеспособные бифидобактерии и лактобактерии, не размножаясь в молоке, не могут расщепить лактозу. В таких продуктах лактоза снижена незначительно.
18. Используя в питании разные продукты человек может с ними получать разное количество лактозы, которая оказывается в просвете кишечника и вызывает симптомы лактазной недостаточности. Живые и активные бифидобактерии и лактобактерии из бифилакта БИОТА, попадая в кишечник начинают в нем активно приживаться и размножаться, при этом они в качестве пищи используют и *расщепляют лактозу, которая оказалась в просвете кишечника, уменьшая ее количество,* что ведет к уменьшению симптомов лактазной недостаточности у детей и взрослых.	18. Поскольку в аптечные препараты лактозу даже специально добавляют, как компонент препарата, то такие лекарства запрещены для применения у людей с лактазной недостаточностью. Если же препарат выпускается без добавления лактозы, то нежизнеспособные бифидобактерии и лактобактерии в аптечных препаратах не способны в кишечнике активно размножаться и, поэтому, не могут эффективно использовать лактозу в просвете кишечника в качестве питания и не могут уменьшать ее количество в просвете кишечника.	18. Поскольку в обогащенные кисломолочные продукты добавляют нежизнеспособные бифидобактерии и лактобактерии, то в таком же нежизнеспособном виде они попадают в кишечник. В кишечнике они не могут эффективно возобновить свою жизнедеятельность и активно питаться, используя лактозу в просвете кишечника. Такие продукты не могут значимо уменьшить симптомы лактазной недостаточности.
19. Бифилакт БИОТА *награжден Золотыми медалями и дипломами, как функциональный продукт питания,* на Всероссийских смотрах-конкурсах.	19. –	19. –

БИОТА

Россия оценила наш труд

БИОТА

Россия оценила наш труд



БИОТА

Купить всегда свежую продукцию, по низким ценам, можно в фирменном магазине предприятия, расположенному по адресу:
г. Краснодар, ул. Жлобы 1/1,
с 09:00 до 18:00
без перерывов и выходных
телефон (861) 297-00-10, 8 (918) 188-46-08

ООО Промышленная компания «Кубаньтехносервис»

Адрес: 350011,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Старокубанская, д.2/7

телефон/факс (861) 297-36-03,
телефон (861) 297-00-10,
8(918) 188-46-08

электронный адрес: biota23@mail.ru
Сайт: www.disbakteriozu.net